

胃がん

レジメン名称	使用薬剤	投与間隔	高催吐
S-1	TS-1	4投2休、6週/クール	
S-1	TS-1	2投1休、3週/クール	
S-1 + CDDP	TS-1・シスプラチン	3投2休、5週/クール	○
S-1 + CDDP + T-mab	TS-1・シスプラチン・トラスツズマブ	3投2休、5週/クール	○
S-1 + DTX (adjuvant)	TS-1・シスプラチン・ドセタキセル	2投1休、3週/クール	
S-1 + DTX	TS-1・シスプラチン・ドセタキセル	2投1休、3週/クール	
IRI	イリノテカン	2週/クール	
RAM + IRI	イリノテカン・ラムシルマブ	2週/クール	
SOX	TS-1・オキサリプラチン	2投1休、3週/クール	
SOX + T-mab	TS-1・オキサリプラチン・トラスツズマブ	2投1休、3週/クール	
SOX + nivolumab	TS-1・オキサリプラチン・ニボルマブ	2投1休、3週/クール	
Cape + CDDP	カペシタビン・シスプラチン	2投1休、3週/クール	○
Cape + CDDP + T-mab	カペシタビン・シスプラチン・トラスツズマブ	2投1休、3週/クール	○
CapeOX	カペシタビン・オキサリプラチン	2投1休、3週/クール	
CapeOX + T-mab	カペシタビン・オキサリプラチン・トラスツズマブ	2投1休、3週/クール	
CapeOX + nivolumab	カペシタビン・オキサリプラチン・ニボルマブ	2投1休、3週/クール	
FOLFOX	5-FU・オキサリプラチン・レボホリナート	2週/クール	
FOLFOX + nivolumab	5-FU・オキサリプラチン・レボホリナート・ニボルマブ	2週/クール	
weekly PTX	パクリタキセル	4週/クール	
weekly PTX + RAM	パクリタキセル・ラムシルマブ	4週/クール	
weekly nab-PTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル	4週/クール	
RAM + weekly nab-PTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル・ラムシルマブ	4週/クール	
RAM	ラムシルマブ	2週/クール	
nivolumab	ニボルマブ	2週/クール	
nivolumab	ニボルマブ	4週/クール	
pembrolizumab	ペムブロリズマブ	3週/クール	
pembrolizumab	ペムブロリズマブ	6週/クール	
FTD/TPI	トリフルリジン・チピラシル	4週/クール	

FTD/TPI

トリフルリジン・チピラシル

2週/クール

大腸がん

レジメン名称

使用薬剤

投与間隔

高催吐

S-1	TS-1	4投2休、6週/クール	
S-1	TS-1	2投1休、3週/クール	
S-1 + BEV	TS-1・ベバシズマブ	2投1休、3週/クール	
UFT + LV	UFT・ホリナートカルシウム	4投1休	
Cape	カペシタビン	2投1休	
Cape + BEV	カペシタビン・ベバシズマブ	2投1休、3週/クール	
IRI	イリノテカン	2週/クール	
IRI + CET	イリノテカン・セツキシマブ	2週/クール	
IRI + PANI	イリノテカン・パニツムマブ	2週/クール	
S-1 + IRI	TS-1・イリノテカン	2投2休、4週/クール	
S-1 + IRI + BEV	TS-1・イリノテカン・ベバシズマブ	2投2休、4週/クール	
CAPIRI	カペシタビン・イリノテカン	2投1休、3週/クール	
CAPIRI + BEV	カペシタビン・イリノテカン・ベバシズマブ	2投1休、3週/クール	
SOX	TS-1・オキサリプラチン	2投1休、3週/クール	
SOX + BEV	TS-1・オキサリプラチン・ベバシズマブ	2投1休、3週/クール	
CAPOX	カペシタビン・オキサリプラチン	2投1休	
CAPOX + BEV	カペシタビン・オキサリプラチン・ベバシズマブ	2投1休、3週/クール	
FOLFIRI	5-FU・イリノテカン・レボホリナート	2週/クール	
FOLFIRI + BEV	5-FU・イリノテカン・レボホリナート・ベバシズマブ	2週/クール	
FOLFIRI + CET	5-FU・イリノテカン・レボホリナート・セツキシマブ	2週/クール(CET:1週間毎)	
FOLFIRI + CET	5-FU・イリノテカン・レボホリナート・セツキシマブ	2週/クール(CET:2週間毎)	
FOLFIRI + PANI	5-FU・イリノテカン・レボホリナート・パニツムマブ	2週/クール	
FOLFIRI + RAM	5-FU・イリノテカン・レボホリナート・ラムシルマブ	2週/クール	
FOLFOX	5-FU・オキサリプラチン・レボホリナート	2週/クール	
FOLFOX + BEV	5-FU・オキサリプラチン・レボホリナート・ベバシズマブ	2週/クール	
FOLFOX + CET	5-FU・オキサリプラチン・レボホリナート・セツキシマブ	2週/クール(CET:1週間毎)	

FOLFOX + GET	5-FU・オキサリプラチン・レボホリナート・セツキシマブ	2週/クール(GET:2週間毎)	
FOLFOX + PANI	5-FU・オキサリプラチン・レボホリナート・パニツムマブ	2週/クール	
FOLFOXIRI	5-FU・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート	2週/クール	○
FOLFOXIRI + BEV	5-FU・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート・ベバシズマブ	2週/クール	○
GET	セツキシマブ	1週/クール	
GET	セツキシマブ	2週/クール	
PANI	パニツムマブ	2週/クール	
Pembro	ペムブロリズマブ	3週/クール	
Pembro	ペムブロリズマブ	6週/クール	
REG	レゴラフェニブ	3投1休	
FTD/TPI	トリフルリジン・チピラシル	4週/クール	
FTD/TPI	トリフルリジン・チピラシル	2週/クール	
FTD/TPI + BEV	トリフルリジン・チピラシル・ベバシズマブ	4週/クール	
FTD/TPI + BEV	トリフルリジン・チピラシル・ベバシズマブ	2週/クール	
5-FU + I-LV	5-FU・レボホリナート	6投2休、8週/クール	
pertuzumab + trastuzumab	ペルツズマブ・トラスツズマブ	3週/クール	
Ipi + Nivo	イピリムマブ・ニボルマブ	3週間毎・4クールまで 5クール目以降ニボルマブ単剤療法	
ENCO + BINI + GET	エンコラフェニブ・ビニメチニブ・セツキシマブ	1週/クール	
ENCO + BINI + GET	エンコラフェニブ・ビニメチニブ・セツキシマブ	2週/クール	
ENCO + GET	エンコラフェニブ・セツキシマブ	1週/クール	
ENCO + GET	エンコラフェニブ・セツキシマブ	2週/クール	

食道がん

レジメン名称	使用薬剤	投与間隔	高催吐
FP	5-FU・シスプラチン	3~4週/クール	○
FP + nivolumab	5-FU・シスプラチン・ニボルマブ	2週/クール	○
FP + nivolumab	5-FU・シスプラチン・ニボルマブ	4週/クール	○
FP + pembrolizumab	5-FU・シスプラチン・ペムブロリズマブ	3週/クール	○
FOLFOX	5-FU・オキサリプラチン・レボホリナート		
DTX	ドセタキセル	3~4週/クール	

PTX	パクリタキセル	6投1休、7週/クール	
DCF	ドセタキセル・シスプラチン・5-FU	4週/クール	○
nivolumab	ニボルマブ	2週/クール	
nivolumab	ニボルマブ	4週/クール	
pembrolizumab	ペムブロリズマブ	3週/クール	
pembrolizumab	ペムブロリズマブ	6週/クール	
ipillimumab + nivolumab	イピリムマブ・ニボルマブ	ニボルマブ 2週間毎 イピリムマブ 6週間毎	
ipillimumab + nivolumab	イピリムマブ・ニボルマブ	ニボルマブ 3週間毎 イピリムマブ 6週間毎	

消化管間質腫瘍(GIST)

レジメン名称	使用薬剤	投与間隔	高催吐
imatinib	イマチニブ	連日投与	
sunitinib	スニチニブ	4投2休	
regorafenib	レゴラフェニブ	3投1休	
pimipespib	ピミテスピブ	5日間服用2日間休薬	

膵がん

レジメン名称	使用薬剤	投与間隔	高催吐
S-1	TS-1	4投2休、6週/クール	
S-1	TS-1	2投1休、3週/クール	
GEM	ゲムシタビン	3投1休、4週/クール	
GEM + S-1	TS-1・ゲムシタビン	2投1休、3週/クール	
GEM + nab-PTX	アルブミン懸濁型パクリタキセル・ゲムシタビン	3投1休、4週/クール	
FOLFIRINOX	5-FU・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート	2週/クール	○
mFOLFIRINOX	5-FU・オキサリプラチン・イリノテカン・レボホリナート	2週/クール	○
FF + イリノテカン リポソーム製剤	5-FU・イリノテカン(リポソーム懸濁剤)・レボホリナート	2週/クール	
olaparib	オラパリブ	連日投与	

胆道がん

レジメン名称	使用薬剤	投与間隔	高催吐
--------	------	------	-----

S-1	TS-1	4投2休、6週/クール
S-1	TS-1	2投1休、3週/クール
GEM	ゲムシタビン	3投1休、4週/クール
GEM + S-1	TS-1・ゲムシタビン	2投1休、3週/クール
GEM + CDDP	ゲムシタビン・シスプラチン	2投1休、3週/クール
GEM + CDDP + durvalumab	ゲムシタビン・シスプラチン・デュルバルマブ	3週/クール

肝細胞がん

レジメン名称	使用薬剤	投与間隔	高催吐
atezolizumab + bevacizumab	アテゾリズマブ・ベバシズマブ	3週間毎	
sorafenib	ソラフェニブ	連日投与	
lenvatinib	レンバチニブ	連日投与	
regorafenib	レゴラフェニブ	3投1休、4週/クール	
ミリプラ動注用(+ミリプラ用懸濁用液)	ミリプラチン		

炎症性腸疾患(クローン病・潰瘍性大腸炎)

レジメン名称	使用薬剤	投与間隔	高催吐
インフリキシマブ(レミケード)	インフリキシマブ	8週毎	
ヒュミラ	アダリムマブ	2週毎	
エンタイビオ	ベドリズマブ	8週毎	
ステラーラ	ウステキヌマブ	12週毎	
シンポニー	ゴリムマブ	4週毎	